

Session de rattrapage 2009

<http://webserver.iam.net.ma/~chellali/sma2>

email : mustapha.chellali@gmail.com

Les Problèmes I, II , III et IV sont indépendants

I Soit A un anneau. On pose $m = \text{Car}(A)$ la caractéristique de A . On suppose que

$$\forall x \in A \quad x^6 = x \quad (*)$$

- 1 Montrer que $\forall x \in A \quad 62x = 0$ (Indication faire $x' = 2x$ dans $(*)$)
- 2 Montrer que $\forall x \in A \quad 726x = 0$ (Indication faire $x' = 3x$ dans $(*)$)
- 3 En déduire que m divise 2. (On donne $62 = 2.31 \quad 726 = 2.3.11.11$)
- 4 En déduire que $\forall x \in A \quad 2x = 0$
- 5 Montrer que $\forall x \in A \quad (1+x)^6 = x + 1 + x^4 + x^2$
- 6 En déduire que $\forall x \in A \quad x^2 = x$
- 7 Montrer que A est commutatif. (Seuls les résultats du cours peuvent être admis et utilisés sans démonstration)

II Soient dans $\mathbb{R}[X]$ les polynômes $A = X^2 + X - 2$ et $B = X^2 + 2X + 1$

- 1 En utilisant l' algorithme d'Euclide, montrer que $\text{pgcd}(A, B) = 1$
- 2 En déduire $U, V \in \mathbb{R}[X]$ vérifiant

$$UA + VB = 1 \quad \text{avec} \quad d^\circ(U), d^\circ(V) \leq 1$$

- 3 Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction

$$F = \frac{X^6}{(X^2 - 2X + 1)(X^2 - 2X + 2)^2}$$

III Soit K un corps commutatif. Soit $m, n \in \mathbb{N}$ avec $m, n \geq 1$. Soit $A \in M_{m,n}(K)$ une matrice m lignes, n colonnes. $((m, n)$ s'appelle la taille de A). Soit $B \in M_{n,m}(K)$.

- 1 Justifier que les matrices suivantes sont définies et donner leurs tailles

$$AB \quad BA \quad BAB$$

Pour une matrice carrée $M = (\alpha_{ij})$, on appelle trace de M le scalaire $\sum_i \alpha_{ii}$. On le note $\text{tr}(M)$

- 2 Montrer que $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$
- 3 En déduire que $\text{tr}((AB)^2) = \text{tr}((BA)^2)$ (Indication : $(AB)^2 = A(BAB)$)

4 Plus généralement montrer que $\forall k \in \mathbb{N} (k \geq 1) \quad tr((AB)^k) = tr((BA)^k)$

5 Montrer que l'application $M \in M_p(K) \longrightarrow tr(M) \in K$ est linéaire.

Dans la suite on note $C = I - AB$ et $D = I' - BA$ (I, I' désignant les matrices identités respectivement de même taille que AB et BA)

6 Montrer que $tr(C) - tr(D) = m - n$

7 Plus généralement montrer que $\forall k \in \mathbb{N} (k \geq 1) \quad tr(C^k) - tr(D^k) = m - n$

On fixe

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

8 Calculer AB et BA

9 Vérifier que $det(C) = det(D)$ (Justifier vos calculs)

IV Soit l'application $f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) \longrightarrow (x_3 + x_1, x_4, x_3 + x_1 + x_4)$$

1 Montrer que f est linéaire.

2 Soient B_1, B_2 les bases canoniques respectivement de \mathbb{R}^4 et \mathbb{R}^3 . Calculer $M_{B_1 B_2}(f)$

3 Pour $v \in \mathbb{R}^4$ et $w \in \mathbb{R}^3$, écrire matriciellement la relation $f(v) = w$.

4 Donner une base et la dimension de $Ker(f)$.

5 Donner une base et la dimension de $Im(f)$.

6 Vérifier la relation liant $dim(Ker(f))$ et $dim(Im(f))$.